

PRIMASTAR

HERBISIDA

300/100 SL

Bahan Aktif : isopropil amina glifosat : 300 g/l
(setara dengan glifosat : 222 g/l) + 2,4-D dimetil amina : 100 g/l
(setara dengan 2,4-D : 83 g/l)

Nomor Pendaftaran : RI. 01030120083285



Petunjuk Penggunaan:

Tanaman	Gulma Sasaran	Dosis Formulasi (Volume air)	Cara dan Waktu Aplikasi
Kelapa sawit (TBM)	Gulma berdaun lebar : <i>Ageratum conyzoides</i> <i>Borreria alata</i>	3 - 4 l/ha	Penyemprotan volume tinggi. Lakukan penyemprotan pada saat gulma sedang tumbuh aktif, penyemprotan dilakukan pada pagi hari dan diperkirakan hujan tidak akan turun 6 jam setelah penyemprotan. Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang. "Tidak untuk tanaman padi"
	Gulma berdaun sempit : <i>Ischaemum timorense</i> <i>Ottochloa nodosa</i>	4 l/ha	

Herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit pada tanaman kelapa sawit (TBM).



Ageratum conyzoides



Borreria alata



Ischaemum timorense



Ottochloa nodosa